



## PRODUCTINFORMATIE

### RODILON SOFT BLOCK

#### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van zwarte en bruine ratten en huismuizen in gebouwen met dien verstande, dat het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde lokaasdoosjes of veilig afgedekt op hiervoor geschikte trays. Plaats het lokaas buiten bereik van kinderen, vogels en (huis)dieren.

De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

##### Toepassingen:

Rodilon soft block is een kant-en-klaar lokaas in pasta formulering dat uitsluitend binnenshuis mag worden toegepast. Het zakje waarin Rodilon soft block zich bevindt hoeft niet te worden verwijderd. Het lokaas uitzetten op plaatsen waar de ratten en muizen geregeld komen: in de nabijheid van hol ingangen, op looppaden (sporen!) en op plaatsen waar de dieren voedsel halen of knagen. Het middel dient gedurende een aantal dagen in voldoende mate te worden gegeten door ratten en huismuizen.

Zet het lokaas veilig uit zodat het risico van consumptie door andere dieren (huis- of landbouw dieren, vogels) en kinderen wordt voorkomen. Indien mogelijk het lokaas zo vast maken dat het niet weggesleept kan worden. De lokaasdoosjes of veilig afgedekte trays markeren zodat duidelijk is dat ze rodenticiden bevatten. Na gebruik handen wassen.

##### Richtlijnen:

##### **Bestrijding van ratten:**

Plaats het lokaas op een afstand van 4 tot 10 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de rattenplaag. Gebruik 6 zakjes lokaas (60 gram) per plek. (NB: ingeval van zwarte ratten vooral hooggelegen voerplaatsen inrichten).

##### **Bestrijding van muizen:**

Plaats het lokaas op een afstand van 1 tot 3 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de muizenplaag. Gebruik 2 zakjes lokaas (20 gram) per plek.

##### **Vervolg bestrijdingsactie:**

Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens regelmatig op basis van opname (wekelijks of elke 14 dagen). Ververs of vul het lokaas daar waar nodig is aan tot er in het geheel geen opname meer plaats vindt. Middel dat beschimmeld of verontreinigd is totaal vervangen. Indien het lokaas geheel opgegeten is, met een dubbele hoeveelheid lokaas hervullen.

Wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en in plastic verpakt aanbieden bij het Klein Chemisch Afval (KCA) depot. Dode dieren (de eerste worden na ca. 3 dagen gevonden) eveneens verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponeren, opdat huisdieren en

andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd. Katten tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren. Verder de nodige maatregelen (laten) treffen in het belang van rat- en muiswering.

**Resistentie management:**

Voor de werkzame stof aanwezig in het middel, difethialon, is er een risico dat muizen of ratten resistentie ontwikkelen. Gebruik dit middel daarom niet in gevallen dat resistentie waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met difethialon bevattende middelen niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de populatie.

**Eerste Hulpmaatregelen:**

Houdt dit etiket beschikbaar wanneer medisch advies wordt ingewonnen.

In geval van nood contact opnemen met een dokter.

Tegengif: Vitamine K (onder medische begeleiding)

N.B. Indien in aangebouwde ruimten ook ratten of huismuizen aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts blijvend zijn, wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd.

**Waarschuwingzinnen:**

- Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
- Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**Veiligheidsaanbevelingen:**

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Niet roken tijdens gebruik.
- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
- Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidsgegevenskaart.

**Rodilon soft block**

Werkzame stof

Gehalte

Aard van het preparaat

Toxicologische groep

Giftigheid

Verpakkingen

Droog bewaren

Toelatingsnummer 12966N

Difethialon

0,0025 %

Lokmiddel (klaar voor gebruik)

Anti-coagulant

Xn = Schadelijk

4 x 2,5 kg draagkarton